

UUSI JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

2025–2029

KAINKOIRA



Hyväksytty rotuyhdistyksen vuosikokouksessa
Hyväksytty rotujärjestö SSKY:n vuosikokouksessa
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt

Jalostuksen tavoiteohjelman sisältö

Sisällys

1.	YHTEENVETO	3
2.	RODUN TAUSTA.....	3
3.	JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA	4
4.	RODUN NYKYTILANNE	5
4.1.	Populaation rakenne ja jalostuspohja.....	5
	Populaation jalostuspohjan laajuus sekä tärkeimmät sitä kaventavat tekijät	8
4.2.	Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet.....	8
4.2.1	Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta.....	8
4.2.2	Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa.....	8
4.2.3	Käyttö- ja koeominaisuudet	10
4.2.4	Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen	11
4.2.5	Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden korjaamisesta.....	12
4.3.	Terveys ja lisääntyminen.....	12
4.3.1	PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat.....	12
4.3.2	Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat.....	12
4.3.3	Yleisimmät kuolinsyyt	15
4.3.4	Lisääntyminen	15
4.3.5	Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet	16
4.3.6	Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä.....	16
4.4.	Ulkomuoto	16
5.	YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA.....	17
6.	JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS	17
6.1.	Jalostuksen tavoitteet	17
6.2.	Suosituksset jalostuskoirille ja yhdistelmille	18
6.3.	Rotujärjestön toimenpiteet	18
6.4.	Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin	19
6.5.	Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta.....	19
7.	LÄHTEET.....	20
8.	LIITTEET.....	20

1. YHTEENVETO

Kainkoiran jalostuksessa painotetaan populaation monimuotoisuutta terveyden ja rodun kehityksen vuoksi. Populaatio kasvaa tasaisesti, ja tuontikoirat tuovat geenipohjaa. Sukusiitosprosentin ylläpitäminen suositusten rajoissa on tärkeää. Sukusiitosprosentin suositusraja on 6,25%.

Kainkoirien luonne on oppimiskykyinen, voimakas ja itsenäinen, korostaen uskollisuutta omistajalle. Yhdistyksen toteuttama käyttäytymis- ja luonnekysely osoittaa avoimuutta ja rohkeutta, mutta ongelmia esiintyy hihnäkäytöksessä ja sukukypsyyden jälkeisessä vastakkaiseen sukupuoleen kohdistuvassa aggressiivisuudessa. Kainkoirat soveltuvat erinomaisesti seurakoiriksi, täyttäen rodunmääritelmän toivotut piirteet. Rodulla on kuitenkin havaittu joitain luonteenpiirteisiin liittyviä haasteita, kuten varauksellisuutta vieraita koiria tai ihmisiä kohtaan.

Terveysongelmat liittyvät lonkkadysplasiaan ja sydänongelmiin ja tunnetut terveysongelmat vaativat tarkkaa seurantaa ja hoitoa rodun säilyttämiseksi terveenä ja elinvoimaisena. Pieni määrä koiria on lopetettu synnynnäisten vikojen vuoksi. Tiedot terveydestä ovat rajalliset, mutta yhdistys kerää aktiivisesti tietoa. Vaikka jalostuspohja on vahva, terveystiedot ovat rajalliset. Monimuotoisuutta ja tasapainoista populaatiota korostetaan, ja terveystilan tarkkailu on aktiivista. Kainkoirat ovat älykkäitä ja uskollisia, mutta sosiaalistaminen on tärkeää. Yhdistys pyrkii ennaltaehkäiseviin toimiin terveyden ylläpitämiseksi

Rodulla on selkeä rotumääritelmä, ja näyttelyissä kainkoirat saavat erinomaisia arvosteluja. Rakennetta ei liioitella, ja toivottavaa on, että luontainen metsästysvietti säilyy. Yhdistys kannustaa myös omistajia osallistumaan näyttelyihin ja muihin arvostelutapahtumiin edistääkseen rodun tunnettavuutta ja vaalimalla rodunmukaisuutta. Kasvattajat voivat saada tukea ja ohjausta yhdistykseltä varmistaakseen vastuullisen jalostuksen.

Jatkuva terveystilan seuranta on elintärkeää rodun kestäväen jalostuksen varmistamiseksi. Yhdistys suosittelee jäsenilleen säännöllisiä terveystarkastuksia ja rohkaisee terveystietojen aktiivista raportointia. Tietoisuus mahdollisista ongelmista ja niiden nopea reagointi ovat avainasemassa. Yhteistyö eläinlääkäreiden ja tutkijoiden kanssa on keskeistä mahdollisten terveysongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja torjunnassa.

2. RODUN TAUSTA

Kainkoira, jota tunnetaan myös nimellä "tiikerikoira" tai "Kai tora-ken", on peräisin muinaisista japanilaisista keskikokoisista koirista, joka on vakiintunut omaksi rodukseen vuoriston ympäröimällä Kain alueella Yamanashin piirikunnassa Japanissa. Alun perin Kainkoiria käytettiin metsästävinä perhekoirina, erityisesti villisian ja kauriin metsästykseseen. Niiden voimakas laumavietti on uskottu vaikuttaneen rodun säilymiseen puhtaana ja alkuperäisenä.

Rotu on erityinen juovikkaan karvapeitteen värinsä osalta. Vaikka Kainkoirat ovat olleet perinteisesti metsästyskäytössä, nykyisin ne toimivat pääasiassa seurakoirina. Kainkoirat ovat myös saavuttaneet huomionarvoisen aseman, sillä ne julistettiin Japanissa kansallisaarteeksi vuonna 1934. Kainkoirasta ollut olemassa kahta erilaista tyyppiä, jotka on nykyisin sekoittuneet keskenään. Nykyisin on nähtävissä näitä kahta ulkonäkötyyppiä nk. peurutyyppi = kapeampi ja kevytluustoisempi sekä nk. villisikatyyppi, joka selkeästi raskarakenteisempi sekä niiden välimuotoja. Näiden tyyppien tulisi olla saman arvoisia ulkomuotoa arvostellessa.

Ensimmäinen Kainkoira tuotiin Suomeen vuonna 2009 Yhdysvalloista. Ensimmäinen pentue on syntynyt kennel Gekkoo No:hon vuonna 2012 vuoden lopussa ja ensimmäinen pentue rekisteröitiin kennelliittoon vuonna 2013. Koiramäärä on kehittynyt runsaasti ajan saatossa, kun rotu on saanut huomiota Suomen lisäksi myös ulkomailla.

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

Suomessa rotua edustaa virallisesti Suomen Nihonken ry, joka toimii Suomen Seurakoirayhdistyksen (SSKY) alaisena rotuyhdistyksenä. Yhdistys perustettiin 1. huhtikuuta 2012 Sastamalassa. Sen pääasiallinen tehtävä on tukea ja edistää keskikokoisten japanilaisten alkuperäisrotujen harrastus- ja kasvatustoimintaa maassa. Nämä keskikokoiset japanilaiset rodut ovat kainkoira, shikokunkoira, kishunkoira ja hokkaidonkoira. Alkuperäinen rotujärjestö on Japanissa toimiva Nippo joka perustettiin vuonna 1937 elvyttämään japanilaisten pystykorvien populaatiota.

Yhdistyksen tehtävänä on toimia alustana näiden rotujen harrastajille ja kasvattajille Suomessa. Se on saanut edustus oikeuden kyseisille roduille SSKY:lta, mikä antaa sille valtuudet edustaa ja tukea kyseisten rotujen kasvatusta ja harrastusta. Tämä valtuus sisältää shikokunkoiran, kainkoiran, kishunkoiran ja hokkaidonkoiran.

VUOSI	JÄSENMÄÄRÄ
2013	ei tietoja
2014	ei tietoja
2015	ei tietoja
2016	97
2017	105
2018	42
2019	48
2020	ei tietoja
2021	70
2022	66
2023	70

Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut vaihtelevaa ja jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 2018 tasaisesti. Yhdistyksen toiminnan painopistealueisiin kuuluu tällä hetkellä rodun terveydentilan ja jalostuksen suunnan seuraaminen. Vaikka yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole jalostustoimikuntaa, sen pyrkimyksenä on kerätä tietoa kyseisten rotujen terveydestä ja huolehtia, että niiden jalostus suuntautuu kestäväällä ja terveellisellä tavalla.

4. RODUN NYKYTILANNE

Kainkoiria on Suomessa tällä hetkellä rekisteröitynä 176 kappaletta vuonna 2023. Vuonna 2022 rekisteröintejä on ollut 30 kappaletta. Vuoden 2022 rekisteröintien määrästä voidaan jo päätellä, että kiinnostus rotua ja kasvatusta kohtaan on noussut suuresti verrannollisesti.

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

Monimuotoisuuden ja jalostuspohjan laajuudella on merkitystä. Monimuotoisuus tarkoittaa geenimuotojen runsautta ja alleeliversioiden moninaisuutta samasta geenistä rodussa. Tämä monimuotoisuus tukee yksilöiden elinvoimaa ja suojaa perinnöllisiltä vioilta ja sairauksilta. Korostetaan myös monimuotoisuuden tärkeyttä immuunijärjestelmälle, ja sen puute voi johtaa erilaisiin terveysongelmiin, kuten tulehduksiin, allergioihin ja autoimmuunitauteihin. Jalostuksen ja perinnöllisen edistymisen mahdollistuminen edellyttää riittävää perinnöllistä vaihtelua koirien välillä.

Suurilukuisuus ei takaa rodun monimuotoisuutta, jos jalostuksessa käytetään vain pientä osaa koirista tai sukulinjoista, tai jos tietyillä koirilla on liian paljon jälkeläisiä suhteessa rodun kokoon. Tällaiset käytännöt voivat levittää haitallisia mutaatioita koko rotuun ja johtaa uusien vikojen tai sairauksien esiintymiseen. Ihannetilanteessa jalostuksessa hyödynnetään koiria tasaisesti kaikista rodun sukulinjoista.

Lopuksi suosituksen perusteella yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle monimuotoisuuden säilyttämiseksi pienilukuisissa roduissa suositellaan enintään 5 %:n rajoitusta neljän vuoden rekisteröintimäärästä laskettuna. Lisäksi pienilukuisissa roduissa toisen polven jälkeläisiä koiralla tulisi olla enintään 10 % laskettuna neljän vuoden rekisteröinneistä. Tämän tavoitteena on turvata rodun geneettinen monimuotoisuus ja ehkäistä perinnöllisiä ongelmia (Kennelliitto Katariina Mäki 5.8.2013)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Pennut (kotimaiset)	17	28	22	21	14	18	10	4	4		5		
Tuonnit	2	1	2	2	1	3	3	3	1	1	1	1	1
Rekisteröinnit yht.	19	29	24	23	15	21	13	7	5	1	6	1	1
Pentueet	4	7	6	5	3	5	2	2	1		1		
Pentuekoko	4,2	4,0	3,7	4,2	4,7	3,6	5,0	2,0	4,0		5,0		
Kasvattajat	4	4	4	5	3	4	2	2	1		1		
Jalostukseen käytetyt eri urokset													
- kaikki	4	7	5	4	3	5	2	2	1		1		
- kotimaiset	1	4	2	1									
- tuonnit	2	2	3	3	2	4	2	1	1		1		
- ulkomaiset	1	1	0	0	1	1	0	1	0		0		
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	7 v 6 kk	4 v 8 kk	4 v 5 kk	3 v 11 kk	5 v 8 kk	3 v	2 v 4 kk	1 v 9 kk	11 kk		1 v 10 kk		
Jalostukseen käytetyt eri nartut													
- kaikki	4	6	6	5	3	5	2	2	1		1		
- kotimaiset	3	4	5	4		4	1	1					
- tuonnit	1	2	1	1	3	1	1	1	1		1		
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä	3 v 4 kk	3 v 10 kk	3 v 10 kk	3 v 10 kk	3 v	3 v 5 kk	3 v 4 kk	3 v 3 kk	2 v 5 kk		3 v 10 kk		
Isoisät	6	7	5	5	3	6	2	3	1		2		
Isoäidit	6	8	5	5	3	6	2	3	1		2		
Sukusiitosprosentti	0,00%	0,22%	0,82%	0,07%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		

Taulukko 1. Vuositilasto – rekisteröinnit 2011-2023 (SKL jalostustietojärjestelmä)

Taulukossa käy ilmi rodun kehittyminen, kasvatus ja tuontimäärä 13 vuoden ajalta. Ensimmäinen kainkoira pentue on syntynyt 2013 ja rotu on jatkanut nousua tasaisesti vuosi vuodelta rekisteröinti määrien perusteella sekä tuontikoirien määrä on pysynyt tasaisena tuomaan geenipohjaa.

Taulukosta käy ilmi, että uroksien jalostuksen käyttöikä on nousussa selkeästi kuin taas narttujen jalostusikä on pysynyt erittäin tasaisena vuosien aikana. Uroksilla keskimääräinen jalostusikä on noin 4 vuotta ja narttujen keskimääräinen jalostusikä on noin 3 vuotta. Rodun sukusiitosprosentti on pysynyt tasaisena koko tämän ajan huomioiden kennelliiton antaman suosituksen, joka on neljän -viiden sukupolven perusteella laskettu sukusiitosprosentti pysyisi alle 6,25%. Tilastossa tulee kuitenkin huomioida mm. rotuun otetut koirat, jolloin osalla jalostukseen käytetyistä koirista sukutaulu jalostustietojärjestelmässä on puutteellinen.

Sukusiitosprosentin suositus perustuu tutkimukseen. Tutkimuksissa on havaittu, että sukusiitoksen haitalliset vaikutukset alkavat näkyä, kun sukusiitosaste ylittää 10 prosenttia. Tällöin lisääntyy riski hedelmällisyyden ja yleisen elinvoiman heikkenemiseen, mikä voi ilmetä lisääntymisvaikeuksina, pentukuolleisuuden lisääntymisenä, pentujen epämuodostumina, vastustuskyvyn heikentymisenä sekä alttiutena tulehduksille. Tätä ilmiötä kutsutaan sukusiitostaantumaksi. On huomattu, että jos sukusiitosaste kasvaa hitaasti useiden sukupolvien aikana, haittavaikutukset ovat pienemmät verrattuna tilanteeseen, jossa sukusiitosta tapahtuu nopeasti, esimerkiksi lähisukulaisten välisissä lisääntymisissä. Suositus ensimmäisen polven osalta 5% neljän vuoden rekisteröinteihin suhteutettuna on 3 pentua ja 10% toisen polven jälkeläisissä 6 pentua. Keskimääräisen pentuekoon ollessa 4 pentua, suositus ensimmäisen polven jälkeläisten määräksi pienilukuisessa rodussa, tässä vaiheessa, on 1-2 pentuetta per koira. (Kennelliitto)

Taulukosta ilmenee, että rotu on selkeässä kasvussa Suomessa rekisteröinti määrien perusteella. Jalostusurosten ikä on nousussa, mutta tulevaisuudessa tuontikoirien myötä tämä voi tasoittua.

#	Uros	Tilastointiaikana					Toisessa polvessa		Yhteensä	
		Synt. vuosi	Pentu-eita	Pentuja	%-osuus	kumulat.%	Pentu-eita	Pentuja	Pentu-eita	Pentuja
1	MIJIKAI NO YAMABUSHI GAROU	2015	4	20	13,42%	13%	4	14	4	20
2	GEKKOO NO KALLAN KUOHU	2017	3	15	10,07%	23%	1	5	3	15
3	TENRO-NO ZANKO	2015	3	13	8,72%	32%	0	0	3	13
4	SAI NO AKATORA GO	2015	4	13	8,72%	41%	5	23	4	13
5	FUNATO KAMIYAMA KOTETSU	2014	3	12	8,05%	49%	5	19	3	12
6	KOROUKAN HOKKOKUOU	2013	4	12	8,05%	57%	5	16	4	12
7	FUNATO KAMIYAMA KAIKOKURO	2014	3	11	7,38%	64%	4	19	3	11
8	YUGIRI SOU GEN		2	10	6,71%	71%	5	18	2	10
9	BLANCO ESTRELLA NEPTUNUS	2018	1	7	4,70%	76%	0	0	1	7
10	SAITO-NO LUKE	2016	2	6	4,03%	80%	2	9	2	6
11	GEKKOO NO DARANIBO	2019	1	5	3,36%	83%	0	0	1	5
12	SAI NO REIHOU GO SAI NOKUNI INOUE SOU	2019	1	5	3,36%	87%	0	0	1	5
13	RANGERIN MÖRKÖ-MARKO	2019	1	5	3,36%	90%	0	0	1	5
14	BESMIRAS FIRST WOLF BOY	2013	1	5	3,36%	93%	0	0	1	5
15	RANGERIN MYTHICAL PEGASOS	2018	1	3	2,01%	95%	0	0	1	3
16	BLANCO ESTRELLA PINO	2015	1	3	2,01%	97%	0	0	1	3
17	AOARASHI NO ROUSHIN	2019	1	2	1,34%	99%	0	0	1	2

Jalostukseen käytettyjen narttujen ikä on pysynyt tasaisena, ja tässä todennäköisemmin ei tule esiintymään nousua tai laskua

18	BLANCO ESTRELLA HIJO	2015	1	2	1,34%	100%	0	0	1	2
----	----------------------	------	---	---	-------	------	---	---	---	---

Taulukko 2. 2009-2023 runsaimmin jalostukseen käytetyt urokset

Taulukko 2 esittää Suomessa eniten jalostukseen käytettyjä uroksia. Eniten pentuja on taulukossa 1. koiralla 1. Mijkai No Yamabushi Garou, jolla myös jälkeisiä käytetty jalostukseen 16. Rangerin Mythical Pegasis. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että populaatioon nähden eniten toisella polvessa jälkeläisiä on koiralla 4. Sai No Akatora No ja toisessa polvessa pentuja kyseisellä koiralla on 23 ja taulukossa esiintyy sijalla 2. Gekkoo No Kallan Kuohu, joka on kyseisen koiran jälkeläinen. Myös tulee ottaa huomioon, että koirilla 5. Funato Kamiyama Kotetsu ja 7. Funato Kamiyama Kaikokuro on molemmilla toisessa polvessa jälkeläisiä 19 kappaletta. Koiralla 7. Funato Kamiyama Kaikokuro on jälkeläinen sijalla 16. Blanvo Estrella Pino. Yhteensä kuusi urosta on tarvittu tuottamaan 50% ajanjakson pennuista.

#	Narttu	Synt. vuosi	Tilastointiaikana			Toisessa polvessa		Yhteensä	
			Pentueita	Pentuja	%-osuus ▼	Pentueita	Pentuja	Pentueita	Pentuja
1	YAMABUSHI NO MAYUMI	2016	2	12	8,05%	1	5	2	12
2	KAKUZAN NO SAKURAHIME	2018	2	11	7,38%	1	5	2	11
3	BLANCO ESTRELLA TIMANTTI	2017	2	11	7,38%	0	0	2	11
4	GEKKOO NO AMATERASU	2012	3	11	7,38%	6	26	3	11
5	TENRO-NO KYOKUKO-HIME	2015	2	9	6,04%	4	18	2	9
6	SAI NO KARINA GO	2019	2	9	6,04%	0	0	2	9
7	BLANCO ESTRELLA FLORA	2015	2	9	6,04%	1	3	2	9
8	GEKKOO NO BYAKKO	2015	3	8	5,37%	3	9	3	8
9	GEKKOO NO SAANAN SALAISUUS	2017	2	8	5,37%	1	5	2	8
10	FUNATO-KAMIYAMA ASAHI	2012	3	8	5,37%	6	26	3	8
11	RANGERIN BIBBIDI BOBBIDI BOO	2020	1	5	3,36%	0	0	1	5
12	BLANCO ESTRELLA ROSA	2015	1	5	3,36%	0	0	1	5
13	JOUSOU HARUNA GO SAITOU KENSHA	2018	1	5	3,36%	1	2	1	5
14	KOROUKAN KAGUYAHIME	2016	1	5	3,36%	1	5	1	5
15	CLASSY'S ARCTIC MOONLIGHT	2008	1	5	3,36%	4	13	1	5
16	GEKKOO NO EIKO	2020	1	5	3,36%	0	0	1	5
17	RANGERIN MYTHICAL UNICORN	2018	1	4	2,68%	0	0	1	4
18	BLANCO ESTRELLA RUBIINI	2017	1	4	2,68%	1	3	1	4
19	BLANCO ESTRELLA ARTEMIS	2018	1	3	2,01%	0	0	1	3
20	CRYSTAL YÖN MUSTA KAUNOTAR	2018	1	3	2,01%	0	0	1	3
21	MILSTOLPEN'S BLUE PEARL RUSKA	2020	1	3	2,01%	0	0	1	3
22	BLANCO ESTRELLA TAIFUUNI	2019	1	2	1,34%	0	0	1	2
23	GEKKOO NO AMAYA	2012	1	2	1,34%	3	8	1	2
24	RANGERIN MYTHICAL PHOENIX	2018	1	2	1,34%	0	0	1	2

Taulukko 3. 2009-2023 runsaimmin jalostukseen käytetyt nartut

Taulukko 3 esittää Suomessa eniten jalostukseen käytettyjen narttujen määrää. Eniten pentuja on taulukon ensimmäisellä koiralla Yamabushi No Mayumi 12 pentua ja samalla koiralla on jälkeläinen käytetyimpien uroksien tilastossa sijalla 11. Gekkoo No Daranibo. Kokonaisuuteen ja nykyhetkeen verraten eniten toisessa polvessa jälkeläisiä koiramäärään nähden on 4. Gekkoo No Amaterasu ja 10. Funato-Kamiyama Asashi, joita on molemmilla koirilla 26. 4. Gekkoo No Amaterasu on jälkeläisiä jalostukseen käytetyissä nartuissa sijalla 23. Gekkoo No Amaya ja runsaimmin käytetyissä uroksissa sijalla 2. Gekkoo No Kallankuohu. Sijalla 10. Funato-Kamiyama Asashi on jälkeläisiä runsaimmin käytetyissä uroksissa sijalla 9. Blanco Estrella Neptumus ja sijalla 16. Blanco Estrella Hijo.

Populaation jalostuspohjan laajuus sekä tärkeimmät sitä kaventavat tekijät

Rotu itsessään on Suomessa nuori ja jalostuspohja rajallinen. Jalostukseen käytetyistä koirista Suomessa populaatio on koostunut samansukuisista koirista, mutta sukusiitos on pysynyt hallinnassa tuontikoirien avulla. Ulkomailta aiemman tilaston perusteella tuodaan tasaisesti eri sukulinjan omaavia koiria, joilla saadaan Suomessa kasvatukseen monipuolisempaa geenipoolia. On kuitenkin huomattava, että tuontikoirien sukutaulut ovat tyhjiä kantakirjojen puuttuessa ja osa koirista on otettu rotuun. Nippo- kantakirjojen sekä epävirallisella Nihonken Pedigree Database Online – järjestelmän kautta voidaan hahmottaa sukusiitosprosenttien pysyminen tasaisena, kun oletuksena on että sukutaulut ovat ajan tasalla.

4.2. Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttööminaisuudet

Kainkoirat ovat voimakkaita ja itsenäisiä, ja niitä on kuvailtu myös kissamaiseksi luonteeltaan. Ne ovat erittäin valppaita ja niillä on vahva luontainen metsästysvietti. Kainkoira on tunnettu erityisesti uskollisuudestaan, ja se luokitellaan usein yhden ihmisen koiraksi, joka muodostaa tiiviin siteen omistajaansa. Samoin kuin monet muut japanilaiset rodut, kait ovat tunnettuja siisteydestään ja ne omaksuvat sisäsiisteyden nopeasti. Kait ovat luonteeltaan voimakkaita, ne kantavat arvokkuuttaan ylpeästi.

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta

KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja seurakoira. Rotua käytetään pääasiassa villisian ja kauriin metsästyksen.

KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE: Tarkkaavainen ja hyvin valpas

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Vihaisuus tai liiallinen arkuus sekä selvästi epänormaali käyttäytyminen

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa

Kainkoirat ovat erinomaisia seurakoiria, täyttäen rodunmääritelmän toivotut piirteet. Rotuyhdistys on toteuttanut kyselyn koskien kainkoirien luonteenpiirteistä ja käyttäytymistä. Kyselyn perusteella isoin osa koirista on avoimia ja rohkeita sekä suhtautuvat ihmisiin, koiriin ja uusiin asioihin avoimesti.

Yleisimmät kyselyssä esiintyneet ongelmat liittyvät hihnäkäyttöön ja merkkailuun, kuitenkin erityisesti hihnassa vetämiseen. Toteutetussa kyselyssä kainkoirat voivat suhtautua varauksellisesti muihin koiriin, ja sukukypsyyden jälkeen ilmenee taipumusta aggressiivisuuteen. Kyselyssä havaittu yleinen reaktiivisuus ja resurssiaggressiivisuus toisia koiria kohtaan korostavat tarvetta huolelliseen sosiaalistamiseen.


Lisäksi kainkoirat voivat olla pidättyväisiä vieraita ihmisiä kohtaan, ja osalla ilmenee eroahdistusta. Kyselyssä käynyt ilmi, että pieni osa kainkoirista arastaa voimakkaita ääniä ja erilaisia alustoja. Vaikka suurin osa reagoi aktiivisesti riistaeläimiin, vain muutamalla yksilöllä metsästetään aktiivisesti.

Taulukko 6 esittää kainkoirien näyttelytuloksia. Näyttelyiden EVA ja HYL-laatuarvosanat vuosilta 2013-2023. Edellä esitetyssä taulukossa on näyttelytuloksissa käyttäytymisestä tai tottumattomuudesta johtuvia voivat olla EVA ja HYL.

Rotuyhdistyksen toteuttamaan kyselyyn on vastannut 44 vastaajaa. Koirien ikä- ja sukupuoli jakauma oli taulukon 4. ja 5. mukainen, jossa käy ilmi, että ikäjakauma on ollut laaja-alainen ja koirien sukupuolijakaumasta lähes 60 % on ollut uroskoirien omistajia.

Koirasi ikä


44 vastausta



Taulukko 4.

Koiran sukupuoli

44 vastausta



Taulukko 5.

	EVA	HYL	Yhteensä
Junioriluokka	7 tulosta	0 tulosta	234 tulosta
Nuorten luokka	0 tulosta	0 tulosta	137 tulosta
Avoin luokka	1 tulosta	1 tulosta	140 tulosta
Käyttöluokka	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta
Valioluokka	1 tulosta	0 tulosta	212 tulosta
Veteraaniluokka	0 tulosta	0 tulosta	75 tulosta
Yhteensä	9 tulosta	1 tulosta	798 tulosta

Taulukko 6. Näyttelytulokset

4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet

Rotua on käytetty alun perin metsästykseen kotimaassaan Japanissa ja pääasiassa rodulla metsästettiin villisikaa ja kaurista. Rotu toimii tällä hetkellä pääosin seurakoirana muutamaa yksilö lukuun ottamatta, joita aktiivisesti käytetään metsästykseen. Viime vuosina rodun edustajia on käytetty metsästyskoirien jäljeltämis kokeissa (Taulukko 6), luonnetesteissä ja aktiivisimmin näyttelyissä Suomessa sekä ulkomailla.

AVO					
	2023	2022	2021	2020	2019
AVO1					
AVO2					
AVO3					
AVO0	4 tulosta	2 tulosta	1 tulosta		
AVO-		1 tulosta			
Yhteensä	4 tulosta	3 tulosta	1 tulosta	0 tulosta	0 tulosta

Taulukko 6.

Rotuyhdistyksen toteuttamassa kyselyssä käy ilmi, että suurella osa kainkoirista reagoi kuitenkin riistaeläimiin ja niiden jälkiin. Lisäksi yksittäisiä kainkoiria on testattu muun muassa epävirallisella Petotestillä. Kainkoirista vain pieni osa osallistunut luonnetestiin (Taulukko 2) ja yksittäisiä koiria on testattu Smartdog – persoonallisuustesteillä.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LTE		1 tulosta	2 tulosta		2 tulosta	
LTE0						
LTE-						
Yhteensä	0 tulosta	1 tulosta	2 tulosta	0 tulosta	2 tulosta	0 tulosta

Taulukko 7.

Kainkoirat ovat olleet pääsääntöisesti käsiteltävissä näyttelyissä. Erityisesti nuoret ja kokemattomat koirat ovat saattaneet väistää tuomarin yrittäessä koskettaa koiraa tai tarkastaessa koiran hampaita. Usein edellä mainittuun käytöksen syynä on ollut epävarmuus ja kokemattomuus tilannetta kohtaan.

4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen

Suurin osa kainkoirista täyttää rodunmääritelmän toivomat piirteet ja toimii kotiloissa hyvin seurakoirina. Ne ovat yleisesti hiljaisia ja osaavat rauhoittua, kun niiden perus tarpeet on täytetty. Rodulla on voimakas riistavietti, minkä vuoksi niitä ei suositella pidettävän irrallaan aitaamattomalla alueella ja yhdistyksen toteuttaman kyselyn perusteella (44 vastaajaa) 60,5% ei voi pitää koiraa aitaamattomalla alueella vapaana.

Tottelevaisuuskoulutus voi olla haasteellista, sillä kainkoirat eivät välttämättä ole luonnostaan halukkaita miellyttämään omistajaansa eivätkä jaksaa toistoja ilman omistajan kärsivällisyyttä ja kekseliäisyyttä kuitenkin tässäkin esiintyy poikkeuksia. Kyselyssä suurin osa ongelmista on ollut hihnäkäytökseen liittyviä ongelmia, kuten hihnassa vetämistä.

Rotuyhdistyksen kyselyssä on noussut esille pienissä määrin toisiin koiriin kohdistuva yleinen reaktiivisuus ja resurssiaggressiivisuus, mutta vastaajien kokemuksen mukaan 63% koirista hyväksyy lauman ulkopuolisetkin koirat. Kainkoirat voivat suhtautua varauksellisesti muihin koiriin, eivätkä välttämättä sovellu koirapuistoihin ja erityisesti samaa sukupuolta olevat yksilöt voivat osoittaa aggressiota toisiaan kohtaan sukukypsyyden saavutettuaan.

Kainkoira voi myös olla pidättyväinen vieraita ihmisiä kohtaan, mikä voi ilmetä esimerkiksi kosketuksen väistämisenä, vaikka yleisesti ottaen ne suhtautuvat vieraisiin ihmisiin hillitysti tai ystävällisesti. Kyselyyn vastanneiden perusteella yli 50 % koirista suhtautuu kiinnostuneesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja lapsiin.

Pienellä osalla kyselyyn vastaajista nousi esille koiran pelkäävän ääniä erittäin voimakkaasti tai erilaisia alustoja ja eroahdistusta ilmeni kyselyyn vastanneita 20,5 %. Kuitenkin eroahdistus oli mennyt ja mennyt koiran nuoruusajan ohitse.

Kainkoirat lisääntyvät pääsääntöisesti luonnollisesti ja astutukset sujuvat usein ilman ihmisen apua. Juoksuväliin liittyy yksilöllisiä eroja ja pennut syntyvät yleensä luonnollisesti.

4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohtista sekä niiden korjaamisesta

Kainkoiran rotuna vaatii vahvan sosiaalistamisen ja sosiaalistamisella ehkäistään muun muassa edellä mainittuja ongelmia, joita kyselyyn vastanneet ovat kohdanneet.

Pentuvaiheessa luodut positiiviset kokemukset sekä koira- että ihmissuhteissa ovat merkittävässä roolissa kainkoiran tulevaisuuden kannalta. Kainkoirat voivat osoittaa hieman herkkyyttä ja muistavat ikävät kokemukset paremmin kuin hyvät kokemukset. Kainkoirien kohdalla, kuten muidenkin japanilaisten alkukantaisten rotujen osalta, ei ole vahvaa miellyttämisenhalua ja ne eivät yleisesti ottaen ole erityisen innostuneita toistuvista harjoituksista, joissa korostuu toistuvuus.

Rotuna kainkoira voi olla myös vieraita koiria kohtaan melko dominoiva. Erityisesti urokset eivät tule aina toimeen muiden urosten kanssa.

Yhdistys pyrkii kannustamaan ihmisiä entistä enemmän testauttamaan koiriaan eri luonteen ominaisuuksia mittaavilla testimenetelmillä kuten virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus, Smartdog-, petotesti, SKL:n alainen luonnetesti tai MH-kuvaus.

4.3. Terveys ja lisääntyminen

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet ja viat

Rotu ei kuulu PEVISA-ohjelmaan.

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ja viat

Rodun harvinaisuuden vuoksi sen terveydentilasta on vähän tietoa, mutta toistaiseksi havaittuja terveysongelmia ovat muun muassa kivesvikaisuus, lonkkadysplasia, polven luksaatio ja ristisideongelmat, akillesjänteen luksaatiot, neurologiset oireet, ruokatorven laajentuma (megaesophagus), hammaskiilteen puutokset, sydänongelmat (kammioväliseinäjäreikä, eri asteiset sivuäänet ja keuhkovaltimoaukkojen ahtaumat) sekä silmänsairaudet (glaukooma, PRA, endoteelinen sarveiskalvon dystrofia, PPM iris-iris ja puuttellinen kyynelkanavan aukko). Lisäksi rodulla ilmenee jonkin verran sekä kausi- että ruoka-aineallergioita. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että kyseisen rodun koirilla on yleisesti matala lonkkamaljaisuus.

Syntymävuosi	Syntyneitä	Tutkittu	A	B	C	D	E
2012	7	4 kpl (57%)	1 kpl (25%)	3 kpl (75%)	0 %	0 %	0 %
2013	0	1 kpl (0%)	0 %	0 %	1 kpl (100%)	0 %	0 %
2014	3	2 kpl (67%)	0 %	1 kpl (50%)	0 %	1 kpl (50%)	0 %
2015	10	10 kpl (100%)	3 kpl (30%)	2 kpl (20%)	4 kpl (40%)	1 kpl (10%)	0 %
2016	6	4 kpl (67%)	2 kpl (50%)	1 kpl (25%)	1 kpl (25%)	0 %	0 %
2017	10	8 kpl (80%)	3 kpl (38%)	3 kpl (38%)	1 kpl (12%)	0 %	1 kpl (12%)
2018	20	16 kpl (80%)	3 kpl (19%)	3 kpl (19%)	8 kpl (50%)	2 kpl (12%)	0 %
2019	21	16 kpl (76%)	3 kpl (19%)	8 kpl (50%)	4 kpl (25%)	0 %	1 kpl (6%)
2020	23	16 kpl (70%)	8 kpl (50%)	5 kpl (31%)	3 kpl (19%)	0 %	0 %
2021	19	8 kpl (42%)	2 kpl (25%)	2 kpl (25%)	4 kpl (50%)	0 %	0 %
Yhteensä	119	85 kpl (71%)	25 kpl (29%)	28 kpl (33%)	26 kpl (31%)	4 kpl (5%)	2 kpl (2%)

Taulukko 8. Lonkkanivelen kasvuhäiriö tutkimustilasto.

Kainkoirat kuvataan yleisesti virallisesti lähellä 2-vuoden ikää, joten taulukkoon (Taulukko 8) valittiin kainkoirat syntymävuoden perusteella vuoteen 2021 asti, jolloin saadaan mahdollisimman kuvaava tilasto koirien tutkimusmäärästä suhteutettuna kuvausikäiseen kantaan vuonna 2023. Tilaston perusteella kainkoirien lonkkakuvaus osuus on erittäin hyvä, 71 % (85 kpl) tilastoiduista koirista. Tutkituista kainkoirista lonkkien osalta terveeksi tutkittuja, lonkkatulos A tai B, on 62 % (53 kpl) ja koirista, joilla on dysplasia valtaosa oli lieviä dysplasioita, lonkkatulos C, 31 % (26 kpl). Kainkoirilla kohtalaista dysplasiaa, lonkkatulos D, tutkituilla koirilla on löytynyt 5 %:lla tutkituista koirista (4 kpl) ja vaikeaa dysplasiaa, lonkkatulos E, on löytynyt 2 %:lla tutkituista koirista (2 kpl). Tutkittujen koirien perusteella voidaan kainkoirien lonkkatilannetta pitää melko hyvänä, sillä suurin osa koirista kuvataan ja enemmistöllä tutkituista koirista on terveet lonkat ja koirista, joilla dysplasiaa löytyy, huomattava enemmistö on lievintä versiota.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana.

Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutumisen on täydellistä ja yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta sen yleisyys vaihtelee roduittain. Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden aiheuttamasta nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja nakshteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin tapaturmaan. Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä.

Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä ja oireilu laitetaankin usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan aaltoiluna ja lantion kiertymisinä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten voimistumiseen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen merkitys. Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteiden ja nivelruston koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja, kuten esimerkiksi lantion häpyluun lämpöluudutus, on myös olemassa. Huomioithan, että kirurgisesti hoidettua koiraa ei saa käyttää jalostukseen ja se tulisi siirtää jalostuskieltoon.

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu lonkkien röntgenkuvaukseen. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuva jalostusvalinta johtaa tuloksiin, jos valinta on systemaattista eikä lonkkavikaisia koiria käytetä. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä otetaan huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta. Jalostusindeksejä lasketaan jo useille roduille sekä lonkka- että kyynärnivelistä. Indeksien laskemisen edellytyksenä on riittävä määrä kuvattuja koiria.

(ELT Anu Lappalainen/Suomen Kennelliitto.)

Vuosi	Tutkittu	0	1	2	3	4
2015	20%	100%	0%	0%	0%	0%
2016	0%					
2017	40%	100%	0%	0%	0%	0%
2018	20%	100%	0%	0%	0%	0%
2019	48%	100%	0%	0%	0%	0%
2020	43%	100%	0%	0%	0%	0%
2021	32%	83%	17%	0%	0%	0%
Yhteensä	33%	97%	3%	0%	0%	0%

Taulukko 9. Spondyloositilasto.

Kainkoiria on tutkittu myös spondyloosin osalta. 2015-2021 syntyneistä spondyloosin osalta on tutkittu 31% (34 koiraa), joista SPO 0 tulos on 97%:lla (33) ja SPO 1 tulos 3% (1 koira). Spondyloosi Spondyloosi (spondylosis deformans) on selkärangan ei-tulehdussellinen rappeumasairaus, jossa nikamien reunoille muodostuu luupiikkejä. Alkavassa spondyloosissa luupiikit ovat pieniä löydöksiä yhden tai kahden nikaman päässä ja pitkälle edenneissä tapauksissa nämä piikit kasvavat välilevyjen yli muodostaen sillan viereiseen nikamaan. Koirilla tyypillisimmin muutokset näkyvät lannerangassa sekä viimeisissä rintanikamissa, mutta muutoksia voi löytyä mistä tahansa selkärangan alueelta. Spondyloosi on tyypillinen löydös etenkin iäkkäämmillä lemmikeillä ja ne voivat usein olla täysin oireettomia satunnaislöydöksiä. Iän lisäksi muita syitä luupiikkien kehittymiselle ovat esimerkiksi selkärangan kohdistuvat mikrotraumat (jatkuvan rasituksen seurauksena) tai synnynäiset viat. Periaatteessa mikä tahansa selkärangan epävakautta aiheuttava tila voi altistaa luupiikkien muodostumiselle. Tarkalleen spondyloosin patofysiologia ei kuitenkaan ole selvillä. Spondyloosi voi olla myös sekundääristä, eli jostakin toisesta sairaudesta, kuten välilevyrappeumasta tai lumbosakraalistennoosista johtuvaa.

Spondyloosin lisäksi koiran selkärangassa voi samanaikaisesti ilmetä diffuusi idiopaattinen skeletaali hyperostoosi (DISH). Tässä sairaudessa pehmytkudoksiin muodostuu uudisluumuodostusta, joka näkyy röntgenkuvissa aaltoilevana, vähintään neljän nikamavälin mittaisena muutoksena. Usein DISHiä pidetään voimakkaana spondyloosimuutoksena.

Edetessään spondyloosi voi aiheuttaa erinäistä oireilua, kuten selkärangan liikeradan pientymistä, joka esiintyy koirassa jäykkyytenä. Lisäksi koirilla voi esiintyä ontumista ja hyppäämishaluttomuutta. Luupiikkien kasvuvaiheessa koirat voivat olla kivuliaita, mutta yleensä täysin luutunut silta ei ole enää yhtä kipeä.

Oireilu liittyy usein myös luusiltojen sijaintiin. Jos muutokset ovat ventraalisia, eli luupiikki muodostuu nikaman alapinnalle ovat oireet enimmäkseen selkärangan liikerataan liittyviä. Jos luupiikkejä muodostuu nikamien sivuille tai yläpinnalle, voivat ne pahimmassa tapauksessa painaa hermojuuria, aiheuttaen neurologisia oireita. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi neurologiset puutokset takajaloissa, vaikeammissa tapauksissa esimerkiksi virtsanpidätyskyvyttömyys. Neurologiset oireet riippuvat luupiikkien sijainnista ja siitä, miten voimakkaasti ne painavat hermoja. (lähde: omaeläinlinikka.fi/spondyloosi/)

Rotuyhdistyksen toteuttamassa ajankohtaisessa kyselyssä on noussut esille myös seuraavia sairauksia ja vikoja kuten furunkuloosi, atopia, kilpirauhasen vajaatoiminta, erilaiset hermovauriot, hepatiitti ja paradontiitti.

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt

Kuolinsyy	Keskim. elinikä	Yhteensä
Iho- ja korvasairaudet	2 vuotta 8 kuukautta	1
Muu sairaus, jota ei ole listalla	0 vuotta 2 kuukautta	1
Petovahinko	8 vuotta 6 kuukautta	1
Tapaturma tai liikennevahinko	3 vuotta 3 kuukautta	2
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)	11 vuotta 8 kuukautta	1
Kaikki yhteensä	4 vuotta 11 kuukautta	6

Taulukko 10.

Kainkoirien kuolinsyiden tilasto (Taulukko 10) on suppea pienen kannan vuoksi ja kuolinsyyt ovat moninaiset, eikä tilaston perusteella löydy erityistä yhdistävää tekijää tai sairautta.

4.3.4 Lisääntyminen

Vuositilasto - rekisteröinnit													
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Pennut (kotimaiset)	23	28	22	21	14	18	10	4	4		5		
Tuonnit	2	1	2	2	1	3	3	3	1	1	1	1	1
Rekisteröinnit yht.	25	29	24	23	15	21	13	7	5	1	6	1	1
Pentueet	5	7	6	5	3	5	2	2	1		1		
Pentuekoko	4,6	4,0	3,7	4,2	4,7	3,6	5,0	2,0	4,0		5,0		

Taulukko 11.

Kainkoirien ensimmäinen pentue on syntynyt Suomeen vuonna 2013. Taulukon 11. perusteella voidaan päätellä tyypillisen pentue koon oleva 3-5 pentua. Kainkoirat lisääntyvät pääsääntöisesti luonnollisesti ja astutukset sujuvat usein ilman ihmisen apua. Juoksuväliin liittyy yksilöllisiä eroja ja pennut syntyvät yleensä luonnollisesti.

Tiedossa on, että muutamalla pennulla syntyessään on ollut synnynnäisiä vikoja ja/tai epämuodostumia, joiden vuoksi nämä on jouduttu lopettamaan.

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet

Rodun ulkomuodolla ei ole anatomisia piirteitä, jotka vaikuttaisivat lisääntymiseen tai rodun rakenteessa ei ole lisääntymiseen vaikuttavia ongelmia.

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä

Rodun harvinaisuuden vuoksi sen terveydentilasta on vähän tietoa, mutta toistaiseksi havaittuja terveysongelmia ovat muun muassa kivesvikaisuus, lonkkadysplasia, polven luksaatio ja ristisideongelmat, akillesjänteen luksaatiot, neurologiset oireet, ruokatorven laajentuma (megaesophagus), hammaskiilteen puutokset, sydänongelmat (kammioväliseinämäreikä, eri asteiset sivuäänät ja keuhkovaltimoaukkojen ahtaumat) sekä silmäsairaudet (glaukooma, PRA, endoteelinen sarveiskalvon dystrofia, PPM iris-iris ja puuttellinen kyynelkanavan aukko).

Jatkossa yhdistys kerää yhä aktiivisemmin tietoa rodun terveydestä, jotta voidaan ennaltaehkäistä edellä mainittuja ongelmia terveydessä.

4.4. Ulkomuoto

Kainkoira on keskikokoinen, tasapainoinen ja vankkarakenteinen koira, joka on tyypillinen Japanin vuoristoalueiden edustaja. Sen vahva lihaksisto ja voimakkaat raajat luovat sen erottuvan ulkomuodon. Pää on vahva, ja sen kallo on leveä, jossa on selvästi erottuva otsapenger ja lievä otsauurre. Kirsu on musta, ja kuono-osa kapenee, mutta ei ole liian pitkä. Huulet ovat tiiviit, ja leuat sekä hampaat ovat voimakkaat leikkaavalla purennalla. Posket ovat hyvin kehittyneet.

Kainkoiran silmät ovat lähes kolmionmuotoiset ja tummanruskeat, hieman vinoasentoiset. Korvat ovat kolmiomaiset, eteenpäin kallistuvat ja pystyssä. Kaula on vahva ja lihaksikas, sopien hyvin koko koiran rakenteeseen. Säkä on korkea, selkä suora ja lyhyt, ja lanne leveä sekä lihaksikas. Rintakehä on syvä, ja alalinja kohoaa hieman. Häntä kiinnittyy korkealle ja voi olla tiiviisti kiertyvä, sapeli- tai sirppimäisellä kaarella selän päällä.

Kainkoiran eturaajat ovat hyvin kehittyneet, lavat kohtuullisen viistot ja olkavarret kulmautuneet. Kyynärpäät ovat rungonmyötäiset, ja kyynärvarret suorat sekä voimakkaat. Välikämmenet ovat hieman viistot, ja etukäpälissä on tiiviit varpaat sekä paksut, joustavat päkiät. Takaraajat ovat vahvat ja kohtuullisesti kulmautuneet, kintereet vahvat ja joustavat. Liikkeet ovat kevyet ja joustavat.

Kainkoiran karvapeite on karkeaa ja suoraa peitinkarvaa sekä pehmeää ja tiheää aluskarvaa. Hännässä karva on pitkäkökö ja pysty. Tyypillinen väri on juovikas (brindle), joka voi olla juovikas musta, juovikas punainen tai juovikas ruskea. Rodulle ominaista on, että yksivärisenä syntyvä pentu voi myöhemmin muuttua juovikkaaksi. Kainkoiran säkäkorkeus vaihtelee: uroksilla on keskimäärin 50 cm ja nartuilla 45 cm. Sallitaan poikkeama ± 3 cm.

Kainkoiraa voidaan ulkomuodollisesti edelleen käyttää metsästyskoirana, kunhan yksilöllä on säilynyt luontainen metsästysvietti. Tämä tarkoittaa, että rodulla on edelleen mahdollisuus palvella perinteistä tarkoitustaan metsästyskumppanina. Rotumääritelmä ei sisällä vaatimuksia, jotka voisivat aiheuttaa hyvinvointiongelmia rodulle. Käyttötarkoituksen kannalta rodun rakenne tulee säilyttää luonnollisena ja liioittelemattomana. (Suomen Kennelliitto)

	ERI	EH	H	T	EVA	HYL	Yhteensä
--	-----	----	---	---	-----	-----	----------

Pentuluokka 7-9 kk	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta
Junioriluokka	170 tulosta	51 tulosta	6 tulosta	0 tulosta	7 tulosta	0 tulosta	234 tulosta
Nuorten luokka	105 tulosta	29 tulosta	3 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	137 tulosta
Avoin luokka	104 tulosta	30 tulosta	3 tulosta	1 tulosta	1 tulosta	1 tulosta	140 tulosta
Käyttöluokka	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta
Valioluokka	197 tulosta	14 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	1 tulosta	0 tulosta	212 tulosta
Veteraaniluokka	72 tulosta	3 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	0 tulosta	75 tulosta
Yhteensä	648 tulosta	127 tulosta	12 tulosta	1 tulosta	9 tulosta	1 tulosta	798 tulosta

Taulukko 12. 2013–2023 Näyttelytulostilasto

Nykyisin on nähtävissä näitä kahta ulkonäkötyyppiä nk. peuratyyppi = kapeampi ja kevytluustoisempi sekä nk. villisikatyypin, joka selkeästi raskasrakenteisempi sekä niiden välimuotoja. Näiden tyyppien tulisi olla saman arvoisia ulkomuotoa arvostellessa.

Kainkoiria nähdään aktiivisesti näyttelyissä ja keskimääräisesti erinomaisen arvostelun saaneita koiria ja tästä voidaan päätellä rodun pysyneen rotumääritelmässä. Rodussa ei tällä hetkellä ole toteutettu jalostustarkastuksia.

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA

Rodun ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma on vuosille 2025–2029.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.1. Jalostuksen tavoitteet

JALOSTUSPOHJA:

- Välttää yhdistelmiä, joissa vanhemmat ovat samoista sukulinjoista
- Välttää yhden sukulinjan liiallista käyttöä
- Koko populaatiota käsittävä sukusiitosasteen kasvu pyritään pitämään mahdollisimman pienenä
- Vaalia japanilaisia sukulinjoja ja itämaalaisia piirteitä

KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE:

- Ylläpitää kainkoirille soveltuvaa ja ominaista luonnetta
- Välttää liian aran koiran käyttöä jalostuksessa

TERVEYS JA LISÄÄNTYMINEN:

- Suositeltua, että kaikki jalostuskoirat ovat suorittaneet terveystutkimukset lonkkien, kyynärien, polvien ja silmien osalta. Tällöin saadaan kartoitettua ja edistettyä rodun tilannetta terveyden osalta.
- Pyritään estämään rodussa esiintyvien terveysongelmien yleistymisen.
- Säilyttää rodun hyvät lisääntymisominaisuudet. Vältetään käyttämästä narttuja, joilla on ollut synnytys- tai tiinehtymisongelmia.

ULKOMUOTO:

- Rodun käyttötarkoitukseen soveltuvan ulkomuodon säilyminen
- Säilyttää rodun itämaalaisuus ja kestävä fysiikka

6.2. Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Jalostuskoirien tulee olla terveitä ja rodunomaisia kokonaisuuksia, joilla on tasapainoinen luonne ja puuttuvat arkielämää hankaloittavat käyttäytymis- tai luonneominaisuudet, kuten liiallinen arkuus tai aggressiivisuus. Terveiden osalta jalostuskoiran ei tulisi kärsiä sairauksista, jotka vaikeuttavat normaalia arkielämää. Kuitenkaan ei suositella toistuvia yhdistelmiä, ellei tähän ole painavia perusteita esimerkiksi pieni pentue edellisestä kerrasta.

Suositeltavaa on, että molempien vanhempien lonkkadysplasia tutkitaan, ja D-lonkkaisia yksilöitä ei yleisesti suositella jalostukseen. Jos D-lonkkaista käytetään perustellusta syystä, sen parituskumppanin tulee olla lonkkatutkimukseltaan luokasta A tai B. Sukusiitosta tulisi välttää, erityisesti yli 6,25 % sukusiitosastetta 5 sukupolven aikana.

Rodunomaisuus ulkomuodossa on tärkeää, ja molempien vanhempien tulisi täyttää rodun ulkomuodolle asetetut standardit. Tämä voidaan arvioida vähintään näyttelyarvosanalla EH tai vaihtoehtoisesti suoritettulla ulkomuodon jalostustarkastuksella.

6.3. Rotujärjestön toimenpiteet

Yhdistys keskittyy tarkkailemaan rodun kehitystä sekä kansainvälisesti että Suomessa. Vuosittain yhdistys julkaisee jäsentiedotteen, johon kootaan yhteen koko vuoden tapahtumat yhdistyksen vastuulla olevista roduista.

Yhdistyksen alaista käyttäytymis- ja luonnekyselyä jatketaan edelleen. Tavoitteena on kerätä lisää tietoa koirien käyttäytymisestä ja luonteesta. Samalla innostetaan rodun edustajia osallistumaan alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisiin kokeisiin sekä muihin testeihin, jotka arvioivat koirien ominaisuuksia.

Lisäksi yhdistys harkitsee mahdollisuutta järjestää jalostustarkastuksia lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on tuottaa arvokasta tietoa rodun jalostuksen suunnittelua varten ja samalla yhdistys pyrkii kannustamaan omistajia terveystutkimuksiin.

Yhdistys pyrkii tiedottamaan sairauksista ja antamaan jalostussuosituksia. Kyselytutkimusten avulla seurataan rodun tilaa ja terveydentilaa.

6.4. Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin

Kainkoirien keskeisin ongelmakohta liittyy kapeaan geenipooliin, mikä tekee eri sukuisien koirien löytämisestä äärimmäisen haastavaa. Luonteen kehityksen uhkina mainitaan asiat, jotka ovat ilmenneet omistajille suunnatussa käyttäymis- ja luonnekyselyssä vuonna 2023. Kyselyä päätetään jatkaa pitkään yksilöiden luonteen ja käyttäytymisen arvioimiseksi.

Joitakin yksilöitä on testattu Smartdog- ja Petotesteissä, mutta testattujen yksilöiden vähyyden vuoksi saatu tieto on toistaiseksi rajallista. Terveysongelmat tiedostetaan, ja koiria kuvataan aktiivisesti ja laajasti.

6.5. Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

Tällä hetkellä pääasiallinen ponnistus on suunnattu kattavan tiedon ja datan keräämiseen rodun terveydestä. Koska kyseessä on edelleen melko harvinainen ja vähälukuinen rotu, on vaikeaa hahmottaa tarkasti mahdollisten terveysongelmien laajuutta.

Koirien terveydentilan tutkiminen on parhaillaan aktiivisessa vaiheessa, ja tätä työtä pyritään jatkamaan samalla innolla. Tämän mallin mukaan toimiminen on saanut positiivista kannustusta. Tavoitteena on jatkaa terveystutkimuksen toteuttamista ja samalla pyritään luomaan kansainvälinen terveystutkimus. Suomen Nihonken ry:llä on jo usean vuoden ajan ollut käynnissä laaja terveystutkimus, joka kattaa alaiset rodut, ja siihen on saatu kiitettävästi vastauksia.

Viime aikoina vastausten määrä on kuitenkin hieman vähentynyt, joten tavoitteena on innostaa ihmisiä osallistumaan kyselyyn entistä aktiivisemmin. Koirien ja niiden terveydentilasta saatava tieto on äärimmäisen tärkeää, jotta tulevaisuudessa voidaan kehittää tarkempia suuntaviivoja jalostuksen parantamiseksi.

vuosi	Toimenpide tai projekti
2025	JTO 2025-2029 astuu voimaan
2025	Pyritään selvittämään mahdollisuus käyttäytymisen jalostustarkastukselle vuodelle 2025
2026	Pyritään selvittämään mahdollisuus ulkomuodon jalostustarkastukselle vuodelle 2026
2027	Terveystutkimus
2028-2029	Päivitetään JTO vuosille 2029-2033

jatkuvasti	Nihonken RY:n yleinen terveystarkastus

7. LÄHTEET

Suomen Nihonken Ry: <https://nihonkenry.weebly.com/kai.html>

Kennelliitto rotumääritelmä:

<https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/5kainkoira.pdf>

Kennelliitto: Katariina Mäki 5.8.2013 <https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/perinnollinen-monimuotoisuus-ja-jalostuspohja>

Kennelliitto: <https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/tietoa-jalostuksen-tueksi/sukusiitos>

Kennelliitto. Anu Lappalainen. Lonkkanivelen kasvuhäiriö. <https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/perinnolliset-sairaudet-ja-koiran-hyvinvointi/lonkkanivelen-kasvuhairio>

8. LIITTEET

Rotumääritelmä

Kyselyn tulokset



Ryhmä: 5

FCI:n numero: 317
Hyväksytty: FCI 9.2.2017
Kennelliitto 25.10.2017

Suomen Kennelliitto-
Finska Kennelklubben ry

KAINKOIRA
(KAI)
Alkuperämaa: Japani

1/4



Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben



KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja seurakoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja
niiden sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu polveutuu muinaisista japanilaisista keskikoisista koirista ja vakiintui omaksi rodukseen vuorten ympäröimällä Kain alueella Yamanashin piirikunnassa. Rotu tunnetaan myös nimellä "Kai tora-ken". Sen erityispiirre on juovikas karvapeitteen väri. Rotua käytetään pääasiassa villisian ja kauriin metsästykseseen. Näiden koirien voimakkaan laumavietin uskotaan vaikuttaneen rodun säilymiseen puhtaana. Rotu julistettiin kansallisaarteeksi vuonna 1934.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tasapainoinen, vankkarakenteinen koira, jolla on hyvin kehittynyt lihaksisto. Tyypillinen Japanin vuoristoalueiden koira. Voimakkaat raajat ja lujat kinteret.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 10:11, narttujen runko voi olla hieman pitempi.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tarkkaavainen ja hyvin valpas.

PÄÄ

Kallo: Leveä otsa.

Otsapenger: Selvästi erottuva, lievä otsauurre

Kirsu: Musta.

Kuono: Kuono-osa kapeneva, ei kovin pitkä mutta kohtuullisen vahva. Kuononselkä on suora.

Huulet: Tiiviit.

Leuat / hampaat: Voimakkaat hampaat, leikkaava purenta.

Posket: Hyvin kehittyneet

Silmät: Lähes kolmionmuotoiset ja väriltään tummanruskeat. Silmät ovat hieman vinoasentoiset.

Korvat: Kolmiomaiset, hieman eteenpäin kallistuvat ja tanakasti pystyssä.

KAULA: Vahva, voimakas ja lihaksikas.

RUNKO

Säkä: Korkea.

Selkä: Suora ja lyhyt.

Lanne: Leveä ja lihaksikas.

Rintakehä: Syvä, kylkiluut kohtuullisesti kaareutuvat.

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, tiiviisti kiertyvä tai sirppimäisellä kaarella selän päällä. Suoraksi vedettynä hännänpää ulottuu lähes kintereeseen.

RAAJAT

ETURAAJAT

Lavat: Kohtuullisen viistot, hyvin kehittyneet lihakset.

Olkavarret: Kohtuullinen lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus.

Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.

Kyynärvarret: Suorat, voimakkaat ja lihaksikkaat.

Välikämmenet: Hieman viistot.

Etukäpälät: Hyvin kaartuvat, tiiviit varpaat. Paksut, joustavat päkiät. Kynnet kovat ja mieluiten väriltään tummat.

TAKARAAJAT

Takaraajat: Hyvin kehittyneet, vahvat ja kohtuullisesti kulmautuneet.

Kintereet: Vahvat ja joustavat.

Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Kevyet ja joustavat.

KARVAPEITE

Karva: Peitinkarva karkeaa ja suoraa, pohjavilla pehmeää ja tiheää. Hännässä karva on pitkähköä ja pystyä.

Väri: Juovikas (brindle): juovikas musta, juovikas punainen ja juovikas ruskea.

Rodulle on tyypillistä, että yksivärisenä syntyvä pentu voi muuttua myöhemmin juovikkaaksi.

KOKO

Säkäkorkeus: Urokset 50 cm

Nartut 45 cm

Sallitaan poikkeama ± 3 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

- huono sukupuolileima
- vaalea kirsu
- lievä ylä- tai alapurenta
- vaaleat silmät
- lyhyt tai pitkä karva
- arkuus

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

- vihaisuus tai liiallinen arkuus
- selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
- voimakas ala- tai yläpurenta
- muut kuin pystyt korvat
- riippuva tai lyhyt häntä
- haalistunut väri
- karvapeitteessä useita valkoisia pilkkuja
- kirjava (laikukas) väritys

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivistä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

Kainkoirien käyttämis- ja luonnekysely

44 vastausta

[Julkaise tiedot](#)




Koiran virallinen nimi ja rekisterinumero
20 vastausta
Blanco Estrella Pippuri, ER13003/20
Jikino Kensha No Merak Go ER52599/21
Rangerin Mythical Phoenix / ER43371/18
Rowhill's Balder ER55517/22
Blanco Estrella ER539171/18
Blanco Estrella Timantti ER48198/17
Rangerin Liian Paksu Perhoseksi / ER43532/21
BE Primogenito
BE Kuulas
Rangerin Kevin
Rangerin Sus siunakkoon
Rangerin Bibbidi bobbidi boo ER54937/20
Gekkoo no Daranibo, ER37236/19
Rangerin Tingtang Wallawalla Bingbang ER54935/20
Rangerin Herra Tossavainen, ER51924/21
Crystal Suviheinä Suhisee
Rangerin Saahkarlahden Santra
Rangerin Tupenrapinat ER52778/22
Riwhill's Siv
Blanco Estrella Prince Shaman, ER49043/21






Koirasi ikä

44 vastausta




Koiran sukupuoli



44 vastausta



Onko koirasi steriloitu tai kastroidu?

44 vastausta





Mikä sairaus koirallasi on todettu tai miksi se on opeoitu? (Vastaa ainoastaan mikäli koirallasi on todettu ohimenevä sairaus, krooninen sairaus tai se on opeoitu)

9 vastausta

Ruoka-aineallergioita

Synnytyksestä aiheutunut hermovaurio tai kohdunkaulan kuroutuma. Ei ole opeoitu, kun tähän ei ole sellaista hoitomuotoa.

Atopiaepäily, vielä ei täyttä diagnoosia iän vuoksi.

Paradontiitti

Laskeutumaton kives (toinen)

Vanhemmuutta on ilmennyt valeanturaa, jotka aiheuttavat furunkkeleita tassuihin. Kana/siipikarja laittaa silmät vuotamaan eli jotain ruoka-allergiaa

Furunkoloosi tassuissa.

Kilpirauhasen vajaatoiminta


Lannerangan hermovaurio




Asumismuoto

44 vastausta



Kopioi






Kopioi

Vartioiko koira ruokaansa tai sille tärkeitä esineitä tai ihmisiä?


44 vastausta



Kopioi

Onko koirallasi ilmennyt koskaan eroahdistusta?


44 vastausta



Kopioi


Tiedätkö onko koirasi vanhemmilla ilmennyt koskaan eroahdistusta?

44 vastausta




Tiedätkö onko koirasi pentuesisaruksilla ilmennyt eroahdistusta?

44 vastausta




Kuinka koirasi suhtautuu aikuisiin ihmisiin sen omalla reviirillä?

43 vastausta



Kuinka koirasi suhtautuu aikuisiin ihmisiin reviirin ulkopuolella?


44 vastausta






Kuinka koirasi suhtautuu lapsiin sen omalla reviirillä?

43 vastausta




Kuinka koirasi suhtautuu lapsiin sen reviirin ulkopuolella?

44 vastausta



Onko perheessänne muita koiria?


44 vastausta






Onko perheenne muu koira tai muut koirat samaa vai vastakkaista sukupuolta?

37 vastausta




Onko koiranne käyttäytynyt koskaan vihamielisesti tai aggressiivisesti perheenne muita koiria kohtaan?

38 vastausta



Onko perheessänne muita eläimiä?


43 vastausta



Kopioi

Onko koiranne käyttänyt koskaan vihamielisesti tai aggressiivisesti perheen muita eläimiä kohtaan?


36 vastausta



Kopioi

Hyväksyykö koiranne perheen ulkopuoliset koirat?

44 vastausta




Koirani hyväksyy perheen ulkopuoliset koirat, jotka ovat sille tuttuja

Kopioi

Onko koirasi yrittänyt koskaan purra ihmistä?


44 vastausta






Onko koirasi yrittänyt koskaan purra toista koiraa?

43 vastausta




Onko koirasi yrittänyt koskaan purra toista eläintä?

42 vastausta




Haukkuuko koirasi?

44 vastausta




Pysyykö koirasi irti aitaamattomalla alueella?

43 vastausta




Reagoiko koirasi riistaeläimiin tai niiden jälkiin?

44 vastausta



Onko koirasi koskaan jahdannut liikkuvia esineitä, kuten autoja, pyöräilijöitä tai jahtaako se palloa mielellään?


44 vastausta



Pelkääkö koirasi erilaisia alustoja kuten ritiloitä, portaita tai hissiä?

Kopioi


43 vastausta



Pelkääkö koirasi yllättäviä tai voimakkaita ääniä?

Kopioi


44 vastausta




Miten koirasi suhtautuu sille yllättäviin tai tuntemattomiin asioihin?

Kopioi

44 vastausta





Kerro omin sanoin jos koirallasi on jokin käytös tai ongelma minkä koette arkea hankaloittavaksi asiaksi (Esimerkiksi liiallinen arkuus, merkailu tai aggressiivinen käytös)

13 vastausta

Merkkailu, hihnakäytös (reagointi ulkona hihnassa toisiin koiriin+hihnassa vetäminen)

Koira pitää kerrostalon rappukäytävää ja piha-aluetta omana reviirinään. Muiden koirien kohtaaminen omalla reviirillä on usein haastavaa.

Pentuna ilmeni eroahdistusta, mutta yhtenä päivänä se loppui, eikä sitä enää sen jälkeen ole esiintynyt.

Ei ole esiintynyt arkea hankaloittavia asioita.

Aloitti merkkaillun vajaa kuukausi sitten ja on kyllä hyvin kiinnostunut hajuista ja merkkaillee jo ikäänsä nähden paljon. Ei onneksi sentään sisällä 😊

Resurssiaggressiivisuus toisia koiria kohtaan, jos kyse on ruuasta tai koiralle tärkeistä leluista. Koiran liiallinen kiintymys omistajaa kohtaan, joka hankaloittaa tilanteita, joissa omistaja ei ole enää koiran kanssa.

Ennen sterilointia arkuus. Edelleen jotkin ympäristöt ja tilanteet voivat aiheuttaa pelkoa, nykyisin palautuu jännittävistä tilanteista nopeammin. Vieraisiin ihmisiin suhtautuu vaihtelevasti. Käytös vaihtelee paljon riippuen tilanteesta ja ympäristöstä.

Portaikot ja jotkin alustat jännittäviä. Ihmisen rakentamat elementit kuten sillat, tms tasot, joissa muuta ympäristöä ylenpänä voi pelottaa, mutta on vielä nuori ja harjoittelee näitä.

Erittäin sukupuoliviettiinen reilun viiden kuukauden iästä saakka. Ei kestä yhtään vieraiden ihmisten kosketusta ja vierastaa todella paljon.

Koirani toinen kives ei ole laskeutunut, se ei haittaa arkea mutta en voi viedä haukkukokeisiin koska en saa koiralleni näyttelytulosta. Se ei haittaa koska käyttö- ja kotikoirana riittää minulle. Luonteeltaan rauhallinen.

Hyvin herkkä koira, joka pelästyy helposti yllättäviä uusia asioita/juttuja. Nyt, kun koira on vanhentunut iältään, on tullut esiin reaktiivisuutta ihmisiä ja koiria kohtaan. Toki tähän saattaa vaikuttaa myös koiran krooninen sairaus.

Hihnakäytös (vetää hihnassa), hyvin reaktiivinen yksilö toisiin koiriin hihnassa.

Hihnakäytös (vetää hihnassa ja reagoi toisiin koiriin), vinkuminen (koira "piippaa") kodin ulkopuolella aina pysähtyessä.

Google ei ole luonut tai hyväksynyt tätä sisältöä. Ilmoita väärinkäytöstä - Palveluehdot - Tietosuojakäytäntö

