


HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI



Suuseksi – mitä vaaroja ja miten tutkin

Eija Hiltunen-Back
LT, erikoislääkäri
Sukupuolitautilin pkl
Tulehduskeskus, HUS

TERVEYSKYLÄ.FI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI



www.kaypahoito.fi/ Seksitaudit

-päivitetty 5/2018

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Potilaan haastattelu

- Oireet
- Altistusajankohta
- Heteroseksii, miesten välinen seksi
- Oraali-, anaaliseksi
- Kondomin käyttö
- Kumppanien taudit?

24.5.2018 3

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Seksitautitestit

Käypä hoito 2018

Tauti	Aikaisin luotettava näytteenotto-ajankohta (oireilevalta näytteet voidaan ottaa heti)	Tarkistus-näytteen ajankohta, jos 1. näyte neg.	Diagnostiset testit
Klamydia	5 vrk		U-ChtrNho ChtrNho
Tippuri	5 vrk		U-CtGcNho CtGcNho GcVi
Kuppa	3-4 vk	1,5 kk	S-TrpaAb (tai S-KardAb + S-TPHA)
HIV-infektio	3-4 vk	3 kk	S-HIVAgAb
Oireinen HSV-infektio			HSVVi HSVpVi HSVNho
Hepatiitti B	3-4 vk	3-4 kk	S-HBsAg
Hepatiitti C	3-4 vk	3-6 kk	S-HCVAb

24.5.2018 4

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Klamydian ja tippurin ilmenemismuodot

Oireeton
Servisiitti
Uretriitti
Proktiitti
Epididymiitti
Faryngiitti
Konjunktiviitti
Sisäsynnyntulehdus (PID)

Käypä hoito 2018 5

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Nielun klamydia ja tippuri

- Usein oireeton tai vähäoireinen
- Kurkkukipu, polttava kirvely, kuivuuden tunne
- Kuume, päänsärky

klamydia + tippuri	U-ctgcNho, -CtGcNho (emätin, nielu, peräaukko, sidekalvo)
tippuri	gc-vi

24.5.2018 6

tauti	mikrobilääke	annos	hoitoaika
Klamydia	atsitromysiini tai doksisykliini (myös ekstragenitaalien infektiot)	1 g 100 mg x2	kerta-annos 7 vrk
Tippuri	<ul style="list-style-type: none"> herkkyysmäärityksen mukaan jos kanta ei tiedossa, keftriaksoni + atsitromysiini 	500 mg im 2 g	kerta-annos kerta-annos

Käypä hoito 2018

Kupan primaarivaihe 3 vko-

- Tartuntakohtaan haava(t)
- Kivuton vallireunainen haavauma, imusolmukkeet
- 4-12 %:lla; kieli, huulet, ikenet, pehmeä kitalaki

Kupan sekundaarivaihe 2 kk-

- Syfilidit limakalvoilla, haavaumat, erythema kielessä ja pehmeässä kitalaessa
- Pharyngiitti, tonsilliitti, laryngiitti
- Käheys
- S-TrpaAb seulontaan
- S-kardAb+S-TPHA
- Serologia voi olla negatiivinen primaarivaiheessa!

HIV-infektio

- Ensitauti
- kehittyy 30-50%:lle 2-6 vkoa tartunnasta
 - oireet muistuttavat flunssaa tai mononukleosia
- Oireeton vaihe
- Oireinen HIV-infektio
- Imusolmuke suurentumat, pitkittynyt kuumeilu tai ripuli, sammus, laihtuminen, voimakas yöhikoilu
- AIDS-vaihe
- seurannaistautien kehittyminen

Kondyloomat

- Aiheuttajat yleensä matalanriskin HPV 6/11
- Ei seulontatestiä
- Diagnoosi kliininen, histologia

Genitaalierpes

- Huulierpes
- Oireeton viruseritys
- HSVVi
- HSVAg
- HSVNho