

## ILMOITUSKOOT JA -PAIKAT

### ETUKANSI

- 95 mm x 135 mm



### KOKOSIVUN ILMOITUKSET

- etusisäkansi, takasisäkansi ja takakansi  
105 mm x 175 mm  
(+ leikkausvarat 3 mm ja leikkausmerkit)
- sisäsivut 4 kpl  
105 mm x 175 mm  
(+ leikkausvarat 3 mm ja leikkausmerkit)

| Lääkeline                            | Käyttöö puoltaa   | Käyttöö rajoittaa  |
|--------------------------------------|---|--|
| Angiotensini II reseptorin salpaajat | Sydämen vajaatoiminta<br>Diabetes mellitus<br>Sairastettu sydäninfarkti                                   | Raskaus  |
| ACE-estäjät                          | Sydämen vajaatoiminta<br>Diabetes mellitus<br>Sairastettu sydäninfarkti<br>Sopeuttamattomi Ateroskleroosi | Raskaus<br>ACE-estäjän aiheuttama yskä   |
| Kaliumkanavien salpaajat             | Perifeeriset verenkierroshäiriöt<br>Angina pectoris (amlodipiini, felodipiini) lääk. potilas              | AIV-johtumishäiriö (diilataaseen, verapamiili)<br>Sydämen vajaatoiminta (paitsi amlodipiini) |
| Diureetit                            | Sydämen vajaatoiminta<br>lääk. potilas<br>Korkea systolinen paine<br>Edulinen tainta                      | Kihti<br>Muita metaboliset sivuvaikutukset   |
| Beetasalpaajat                       | Sepevalittomuus<br>Sydämen vajaatoiminta<br>Hyperkinesia<br>Migreeni                                      | Astma/COPD<br>AIV-tauti<br>Fyysisen suorituskyvyn lasku<br>Metaboliset sivuvaikutukset       |

**Orionilla on Candesartan Orion**  
4 mg, 8 mg, 16 mg ja 32 mg tabletit

**Välittävä aine:** candesartaanisolikali. **Käyttöaiheet:** Essentiaalisen hypertension ja sydämen vajaatoiminnan ja useimmat kromonin häiriöiden sydämen toiminnan hoitoon aikuisilla. Hypertension hoito lapsilla ja nuorilla (6 vuotta - alle 18 vuotta). **Annoitus ja antotapa:** Antotapa: Suun kautta, kerran vuorokaudessa ruuan kanssa tai ilman ruokaa. **Annoitus:** Hypertension: aikuis- ja teinivaiheen tilanteissa on 8 mg r/u/vk. Suurin osa anti-hypertensiivisistä lääkityksistä saavutetaan neljän viikon kuluessa, annosta voidaan nostaa 16 mg:aan kerran vuorokaudessa, ja edelleen maksimimäärään 32 mg x 1/vk. Hoito tulee jättää verenpainemittauksen mukaan. **Tärkeimmät tiedot:** Kts. valmisteyhteenveto. **Vasta-aiheet:** Yhteiskäyttö kandesartaanisolikaliin tai muihin lääkityksiin, joihin on kieltoja. **Varoitukset:** Vain erikoislääkärin, väkisen valvonnassa ja/tai lääketieteellisen, alle 1 v. lapset, käyttö samanaikaisesti aliskireniin sisältävien valmisteiden kanssa on vasta-aiheista, jos potilaalla on diabeetti mellitus tai munuaisten vajaatoiminta (glomerulusten suodatusnopeus <60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>). **Varoitukset ja käyttöön liittyvät varoitukset:** Kts. valmisteyhteenveto. **Yhteisvaikutukset:** Samanaikainen käyttö kaliumin sisältävien diureettien, kaliuminien tai suolan korvikkeiden tai muiden sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka saattavat suurentaa suuren kaliumipitoisuuden (esim. hepariininäyttö), voi aiheuttaa suuren kaliumipitoisuuden. **Käyttöohjeita:** Käyttö lopetusta tulee seurata tarkasti. **Tärkeimmät tiedot:** Kts. valmisteyhteenveto. **Rakkaus ja imetys:** Raskaus: Käyttöä ei suositella raskauden aikana. **Haittavaikutukset:** Yleiset: Hengitystieinfektio, haimatulehdus, päänsärky, hyökkäily, hypotensio, hypotensio. **Tärkeimmät tiedot:** Kts. valmisteyhteenveto. **Pakkaukset ja hinnat:** (mml:ssä, alv 10%) **20PC:** 4 mg 28 kpl 8,04 €, 32 kpl 6,25 €, 8 mg 28 kpl 6,24 €, 96 kpl 7,94 €, 16 mg 28 kpl 11,67 €, 96 kpl 5,04 €, 32 mg 28 kpl 9,04 €, 96 kpl 11,91 €. **Korvotavat:** Candesartaanisolikaliin: 300 tablettia. Kromonin verenpainetähti (205), kromonin sydämen vajaatoiminta (201). **Reseptiläkkeet:** Valmisteyhteenveto.

### Aineisto:

Painokelpoinen pdf-tiedosto (kuvien resoluutio 300 dpi, CMYK-värit, leikkausvarat 3 mm + leikkausmerkit).

### Painopaperi:

Kannet: Lumi Silk 170 g/m<sup>2</sup>

Sisäsivut: Lumi Silk 115 g/m<sup>2</sup>

Lähetä aineisto sähköpostilla osoitteeseen [sanna.hakkinen@laakariportaali.fi](mailto:sanna.hakkinen@laakariportaali.fi).